

69.384.10

1000 ml

Enzym Ex-Tosan

Enzympräparat zum Abbau von Schleimstoffen in Roggen-, Gersten- und Hafermaischen **Anwendung:** Erforderliche Enzymmenge in ca 10-facher Menge Leitungswasser vorverdünnt nach der Verflüssigungsrast **bei unter 70 °C** in die Maische einrühren. Technische Informationen & Gebrauchsanweisung beachten.

Ideale Temperatur: 50 - 60 °C, **pH Optimum:** pH 5.0-5.5.

Dosierung 15-20 ml / 100 kg Getreide

Préparation enzymatique pour la dégradation du mucilage dans les moûts de seigle, d'orge et d'avoine

***Application :** La quantité requise d'enzyme doit être incorporée dans le moût dans environ 10 fois la quantité d'eau du robinet pré-diluée après l'arrêt de liquéfaction à **moins de 70 °C**. Le moût doit ensuite être nettoyé avec un détergent hydrosoluble. Respecter les informations techniques et le mode d'emploi.*

Température idéale : 50 - 60 °C, **pH optimal :** pH 5,0-5,5

Dosage 15-20 ml / 100 kg de grain

GEFAHR / DANGER

H 334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

P 216 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. P342 + P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONEN-ZENTRUM /Arzt/.../anrufen.

P304+P340 Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

H 334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

P 216 Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. P 342 +

P311 En cas de symptômes respiratoires:

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un

médecin/... P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.



Enthält / Contient: Eiweissenzym, enzyme protéique

Haltbarkeit (ungeöffnet & kühl) / stockage (fermé, au frais):

Siehe Rückenetikette Consulter la contre étiquette

Baldinger

Max Baldinger AG –

CH-5464 Rümikon Tel. +41 (0) 44 806 80 80