

69.390.90 Natuzym DP Ultra 100ml

Pektinolytisches Enzympräparat für die Klärung von Kernobst- und Traubensäften Wirkung:

Natuzym® DP Ultra begünstigt durch den Abbau von Pektin die Klärung des Saftes. **Anwendung:** Natuzym® DP homogen in den zu behandelnden Saft einrühren. Während 1-2 Stunden einwirken lassen. Bei Temperaturen < 45 °C oder pH < 4,5 die Standzeit verlängern oder die Dosierung erhöhen. **Ideale Temperatur:** 45-55 °C, **pH Optimum:** pH > 4,5 **Dosierung** Apfel 2-3 ml / hl, Birne: 3-5 ml / hl.



GEFAHR enthält Eiweissenzym

H 334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

P 216 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.

P342 + P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONEN-ZENTRUM /Arzt/.../anrufen. P304+P340 Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Préparation d'enzymes pectinolytiques pour la clarification des fruits à pépins et de jus de raisin.

Effet : Natuzym® DP Ultra favorise la clarification du jus par la dégradation de la pectine. **Application :** Mélanger Natuzym® DP de manière homogène dans le jus à traiter. Laisser agir 1 à 2 heures. A des températures < 45 °C ou à un pH < 4,5, prolonger la durée de contact ou augmenter le dosage. **Température idéale :** 45-55 °C, **pH Optimum :** pH > 4,5 **Dosage** pomme 2-3 ml / hl, poire : 3-5 ml / hl.

ATTENTION contient des enzymes pectinolytiques

H 334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

P 216 Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. P 342 + P311 En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.