

69.304.92

2 g

Natuzym WM MG

Dosierung (in 10facher Menge Wasser auflösen)

Maischeaufschluss : 2-4 g / hl während 2-4 h bei 10-20 °C

Mostklärung / Flotation: 1-2 g / hl während 1-2 h bei ca 20 °C

Beerenobst & Steinobst: 2 g / hl, Kernobst: 4 g / hl

Dosage (diluer dans de l'eau (10 :1):

Mazeration: 2-4 g / hl pendant 2-4 h à 10-20 °C

Flotation / sédimentation : 1-2 g / hl pendant 1-2 h à 20 °C

Les baies et fruits à noyaux : 2 g / hl, fruits à pépin : 4 g / hl

Achtung / attention



H 334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

P 216 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.

P342 + P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONEN-

ZENTRUM/Arzt/.../anrufen.

P304+P340 Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

H 334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

P 216 Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.

P 342 + P311 En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Enthält / Contient:

Pektolytisches Enzympräparat (PL, IUB 4.2.2.10, Aktivität 350 PLU/g) aus *Aspergillus niger*

Non GMO gemäss 2001/18/EEC

Lebensmittelzulassung nach VO (EG) Nr. 1332/2008

Haltbarkeit (ungeöffnet) / stockage (fermé):

06/2024, Charge 16421

Max Baldinger AG – Baldinger

CH-5464 Rümikon - Tel. +41 (0) 44 806 80 80